

**Poliambulatorio Statuto**

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino

Via Saluzzo 50 • 10125 Torino

Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Via Ivrea 3/A • 10098 Rivoli (TO)

**Per informazioni e prenotazioni**

• Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090

• Sito web: [kormed.it](http://kormed.it)• Email: [accettazione.statuto@kormed.it](mailto:accettazione.statuto@kormed.it)

## Tomografia Computerizzata TC

Nel caso in cui l'esame venga richiesto con la somministrazione del mezzo di contrasto il paziente deve:

- essere a digiuno da 6 ore.
- essere in possesso del dosaggio della creatininemia sierica eseguito nei 3 mesi precedenti; nella settimana precedente in caso di patologia acuta o di evento esterno che possa aver influenzato negativamente la funzionalità renale.
- portare il questionario compilato dal Medico prescrivente (Scheda informativa TC per la somministrazione di mezzo di contrasto iodato).

➔ Per l'esecuzione di URO-TC, oltre alla preparazione sopra riportata, il paziente deve bere 1 litro d'acqua un'ora prima dell'esame e non deve urinare nell'ora precedente l'esecuzione dell'esame.

**Avvertenze e raccomandazioni:**

i pazienti che presentino:

- comprovata allergia a mezzi di contrasto (iodato o paramagnetico)
- asma non controllata
- orticaria e/o angioedema cronici e/o ricorrenti non controllati
- mastocitosi
- anafilassi idiopatica
- valore della creatininemia e/o valore di e-GFR non compreso nei valori di normalità

devono comunicare la presenza di una o più delle suddette condizioni in fase di prenotazione per permettere al Medico Radiologo Responsabile dell'esame di valutare se possibile eseguire l'indagine.

NON sono fattori di rischio:

- Pregressa reazione allergica a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti, polveri, metalli etc.
- Pregressa reazione allergica ad altre categorie di farmaci
- Reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone e iodofornio

La terapia medica eventualmente in atto non deve essere sospesa. Fanno eccezione i Pazienti che assumono metformina e devono eseguire esami TC con MDC o urografie: l'assunzione di metformina deve essere interrotta a partire dalle 48 ore prima dell'esame e fino alle 48 ore successive all'esame.

Tutta la documentazione di eventuali esami precedenti (es. TC, RM, ecografie, radiografie, visite, etc.) deve essere portata in visione al momento dell'effettuazione dell'esame diagnostico, se pertinente con l'esame eseguito.

M0901-19 Rev. 06 di giu-23