

PRELIEVO EMATICO PER RENINA E/O ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO E/O ORTOSTATISMO

Per una corretta esecuzione dell'esame si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni qui di seguito riportate.

PRELIEVO EMATICO PER RENINA e/o ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO (a riposo)

Per questo esame è necessario essere a digiuno da almeno 8 (otto) ore.

Prima di essere sottoposti a prelievo è necessario rimanere a letto in condizione di assoluto riposo per almeno 3 (tre) ore consecutive senza mai alzarsi.

Per questo motivo, per garantire una buona riuscita dell'esame, si comunica che è possibile effettuarlo esclusivamente a domicilio.

PRELIEVO EMATICO PER RENINA e/o ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO (in movimento)

Per questo esame è necessario essere a digiuno da almeno 8 (otto) ore.

Prima di essere sottoposti a prelievo è necessario rimanere in posizione eretta e in movimento (camminando a passo svelto) per almeno 2 (due) ore consecutive, quindi senza mai fermarsi anche solo per breve tempo.

È fondamentale l'indicazione da parte del Medico Curante del tipo di esame da eseguire (a riposo, in movimento o entrambi).