

Preparazione colonoscopia diagnostica e/o operativa

Raccomandazioni per pazienti in terapia anticoagulante (TAO/NAO) e antiaggregante

In corso di terapia anticoagulante orale (*Coumadin – Sintrom*) questa andrà sospesa nei 5 giorni antecedenti all'esame e sostituita con Eparina a basso peso molecolare a dosaggio profilattico: l'ultima somministrazione deve essere eseguita almeno 12 ore prima dell'esame; si raccomanda al paziente di portare in visione un INR di controllo eseguito uno/due giorni prima dell'esame stesso.

Si consiglia di contattare comunque il proprio Medico Curante o Medico Specialista di riferimento o Centro TAO per eventuali diverse indicazioni.

La stessa terapia potrà essere ripresa 24-48 ore dopo la procedura, salvo diversa indicazione dell'operatore gastroenterologo che ha eseguito l'esame diagnostico, tenendo conto della tipologia di procedura e delle indicazioni alla suddetta terapia.

In caso di terapia con i nuovi anticoagulanti orali NAO (*Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Lixiana*) sospendere gli stessi 2 giorni prima dell'esame in caso di paziente con funzionalità renale normale; sospendere 4 giorni prima in caso di paziente con funzionalità renale ridotta.

Si consiglia di contattare comunque il proprio Medico Curante o Medico Specialista di riferimento o Centro TAO per eventuali diverse indicazioni.

Gli anticoagulanti potranno essere ripresi 24-48 ore dopo la procedura, salvo diversa indicazione dell'operatore gastroenterologo che ha eseguito la procedura.

In caso di terapia con antiaggreganti piastrinici la sospensione andrà valutata in base alle indicazioni del proprio Medico Curante/Medico Specialista di riferimento, tenendo conto dell'indicazione a suddetta terapia e della tipologia di farmaco (*Cardioaspirin, Aspirinetta, Cardirene, Tiklid, Plavix, Prasugrel, Brilique*). La ripresa di tali farmaci andrà valutata dall'operatore gastroenterologo che ha eseguito la procedura.

Si ricorda che la sospensione dei farmaci sopra citati nei giorni antecedenti all'esame è indispensabile in quanto durante l'esecuzione della colonoscopia potrebbe essere necessario effettuare una polipectomia. In questo modo al paziente verranno evitati un ulteriore esame e un'ulteriore preparazione.

Raccomandazioni per pazienti diabetici

I pazienti diabetici che assumono ipoglicemizzanti orali o insulina devono consultare il proprio Medico Curante per adeguare l'assunzione di tali farmaci prima dell'esecuzione dell'esame in relazione al ridotto apporto calorico nel giorno dell'esame.

Si consiglia la sospensione di Metformina 48 ore prima della procedura se effettuata in sedazione profonda.

FB_MOD_036A_REVdic25



Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it

Parte del
Gruppo

clariane

Poliambulatorio Fondazione Gaetano e Piera Borghi
Via Petrarca 33 • 21020 Brebbia (VA)

Per informazioni e prenotazioni

- Telefono: 0332 1720020
- Sito web: kormed.it
- Email: accettazione.fondazionegaetanopieraborghi@kormed.it

Indicazioni alimentari e modalità di assunzione di Plenvu

- Nei 5 giorni prima dell'esame
Si raccomanda di assumere abbondante quantità di liquidi (acqua, the, camomilla) nel corso della giornata (almeno 2 litri nelle 24 ore).
- Nei 3 giorni prima dell'esame
Non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi.
- Giorno prima dell'esame
Si può consumare una leggera colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. La cena deve essere costituita esclusivamente da dieta idrica con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa.

Coloscopia dalle 8 alle 10.00

- Il giorno prima dell'esame

Ore: 19.30:

Bere LENTAMENTE la dose 1 di PLENU nell'arco di 30/40 minuti, a piccoli sorsi, meglio fresca (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro). Subito dopo aver terminato la dose 1: è obbligatorio bere ALMENO un altro ½litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari e se si sente lo stimolo della sete.

- Ore: 22.30:

Prima di iniziare la dose 2, bere mezzo bicchiere di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Bere LENTAMENTE la dose 2 di PLENU nell'arco di 30/40 minuti a piccoli sorsi, meglio fresca (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 2: è obbligatorio bere ALMENO un altro ½litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

- Il giorno dell'esame

DIGIUNO (non è permessa la colazione; è consentita tuttavia l'assunzione di liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'esame).

FB_MOD_036A_REVdic25

Coloscopia dalle 10 alle 14

- Ore 19.30-20.00

Bere lentamente la dose 1 di PLENU nell'arco di 30/40 minuti, a piccoli sorsi, meglio fresca (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Subito dopo aver terminato la dose 1: è obbligatorio bere ALMENO un altro ½litro di liquidi chiari (acqua naturale,

Parte del
Gruppo

clariane

Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it



Poliambulatorio Fondazione Gaetano e Piera Borghi
Via Petrarca 33 • 21020 Brebbia (VA)

Per informazioni e prenotazioni

- Telefono: 0332 1720020
- Sito web: kormed.it
- Email: accettazione.fondazionegaetanopieraborghi@kormed.it

the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

- Il giorno dell'esame

Digiuno (non è permessa la colazione; è consentita tuttavia l'assunzione di liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'esame).

- 4 ore prima dell'inizio dell'esame

Prima di iniziare la dose 2, bere mezzo bicchiere di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane).

Bere lentamente la dose 2 di PLENNU nell'arco di 30/40 minuti a piccoli sorsi, meglio fresca (vedi le istruzioni di preparazione illustrate sul retro).

Dopo aver terminato la dose 2: è obbligatorio bere ALMENO un altro ½litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

- 2 ore prima dell'inizio dell'esame

Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

CONTROINDICAZIONI:

Non somministrare PLENNU a pazienti affetti da FENILCHETONURIA (è presente aspartame) e FAVISMO (carenza di glucosio 6-fosfato deidrogenasi (è presente acido ascorbico/ascorbato).


In questi casi i pazienti devono contattare il medico del servizio di gastro-endoscopia digestiva per una preparazione alternativa.

Solo in caso di asportazione di polipo, la dieta priva di scorie andrà osservata per altri 3 gg.

Poiché è possibile, per l'esecuzione dell'esame, che venga somministrato un blando sedativo, è utile che i pazienti vengano accompagnati in quanto impossibilitati a guidare.

Si prega cortesemente di portare con sé tutta la documentazione relativa ad esami, visite o ricoveri ospedalieri in possesso.

FB_MOD_036A_REVdic25



Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it

Parte del
Gruppo

clariane

Per informazioni e prenotazioni

- Telefono: 0332 1720020
- Sito web: kormed.it
- Email: accettazione.fondazionegaetanopieraborghi@kormed.it

Istruzioni di preparazione delle due dosi



PLENVU si presenta in una confezione che contiene due dosi.

Dose 1: una bustina singola

Dose 2: due bustine diverse, A e B, incollate tra di loro (da utilizzarsi insieme)

Come preparare PLENVU Dose 1

- Aprire la scatola ed estrarre la bustina "Dose 1".
- Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente che possa contenere $\frac{1}{2}$ litro di liquido.
- Aggiungere acqua fino a raggiungere $\frac{1}{2}$ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.




Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere almeno un altro $\frac{1}{2}$ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

FB_MOD_036A_REVdic25

Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it

Parte del
 Gruppo

clariane



Per informazioni e prenotazioni

- Telefono: 0332 1720020
- Sito web: kormed.it
- Email: accettazione.fondazionegaetanopieraborghi@kormed.it

Come preparare PLENU Dose 2

- Estrarre la "Dose 2" dalla scatola; versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B della Dose 2 in un recipiente che possa contenere $\frac{1}{2}$ litro di liquido.
- Aggiungere acqua fino a raggiungere $\frac{1}{2}$ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.



Dopo aver assunto la dose di PLENU, bere almeno un altro $\frac{1}{2}$ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Nota Bene: Non invertire la sequenza delle dosi

AVVERTENZE

- In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a 3 volte la settimana) chiedere consiglio al medico per valutare l'aggiunta di un lassativo osmotico a base di Macrogol nei 2-3 giorni precedenti l'inizio della preparazione.
- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti od antiaggreganti chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di PLENU in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastrointestinale senza venire assorbiti.

CONTROINDICAZIONI

PLENU è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di fenilalanina) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi = favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).

FB_MOD_036A_REVdic25



Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it

Parte del
Gruppo

| **clariane**