

Poliambulatorio Statuto

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino

Via Saluzzo 50 • 10125 Torino

Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Per informazioni e prenotazioni

• Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090

• Sito web: kormed.it• Email: accettazione.statuto@kormed.it

Istruzioni per la preparazione della colonscopia con Plenvu

Gentile Signora/Egregio Signore,

Le è stata programmata una colonscopia. Un'adeguata pulizia dell'intestino è fondamentale per l'esecuzione di un esame diagnostico, affidabile, completo e sicuro; se il suo intestino non è correttamente pulito:

- **vi è il rischio** di non identificare eventuali polipi/lesioni
- **l'esame** può diventare più lungo e complesso
- **vi è il rischio** di dover sospendere l'esame e di dover ripetere la preparazione e la procedura

CONSIGLI NEI 7 GIORNI PRIMA DELL'ESAME:

- **Non assumere** medicinali come carbone vegetale o preparati a base di ferro
- **Bere almeno 2 litri di acqua al giorno**
- **In caso di stitichezza** (cioè: necessità di mangiare frutta e verdura per regolarizzare le evacuazioni; meno di 3 evacuazioni alla settimana / presenza di feci dure "caprine"), **paziente diabetico o Parkinsoniano: assumere PER 7 GIORNI REDIEPEG SOLUZIONE ORALE, 1 bustina la mattina e 2 bustine la sera**

Dieta da seguire il giorno precedente l'esame

- **NON assumere** frutta, verdura, legumi, pane e pasta integrali
- **PUO' assumere** pasta e pane di farina bianca, carne magra, pesce, uova, salumi magri, formaggi, patate, gelato, latte, yogurt, brodo e bevande limpide
- **Cena entro le ore 19.00 a base di liquidi chiari e trasparenti anche zuccherati**

Il giorno dell'esame

- **Digiuno:** non è permessa la colazione; è consentita tuttavia **l'assunzione di acqua fino a 2 ore prima dell'esame** per completare la preparazione intestinale o per accompagnare eventuali terapie del mattino.

L'assunzione del lassativo è indispensabile per l'esecuzione dell'esame:

- **PLENVU** questa preparazione prevede l'assunzione di **1 litro di soluzione** suddiviso in due dosi + **simeticone compresse masticabili da 120mg** (es. SIMECRIN 120, non compreso nel kit di preparazione)
NON possono assumere questa preparazione i pazienti con **FAVISMO o FENILCHETONURIA**

Mod-PREPARAZIONE_COLONSCOPIA-pst-rev0-ott25

Poliambulatorio Statuto

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino

Via Saluzzo 50 • 10125 Torino

Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Per informazioni e prenotazioni

• Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090

• Sito web: kormed.it• Email: accettazione.statuto@kormed.it

Nel caso abbia già eseguito una colonscopia e la pulizia del colon **NON** fosse stata adeguata, scelga un preparato differente da quello assunto la volta precedente

Discuta con il suo medico curante o specialista di riferimento quale preparato scegliere in presenza di:
grave insufficienza renale o insufficienza cardiaca congestizia

PLENVU

Preparazione del lassativo:

Ogni confezione di **PLENVU** contiene **Dose 1** una busta e **Dose 2** due buste: (A + B incollate)**Devono essere preparate 2 dosi di lassativo come sotto indicato****1° Dose di lassativo**

Preparazione:

- **Versare** il contenuto della **Dose 1** (una busta) in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido
- **Aggiungere** acqua **fredda non gasata** fino a raggiungere ½ litro
- **Mescolare** fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta (tenere in frigorifero la soluzione fino al momento dell'assunzione)

**Modalità dia assunzione:**

- Assumere ½ Litro di Plevu Dose 1 e terminarne l'assunzione **nell'arco di 40 minuti. La soluzione è da bere fredda**
- Al termine **bere** almeno ½ litro/1 litro di liquidi chiari non gasati e non alcolici (acqua, camomilla, brodo, tisane) **in 30/45**
- Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete

2° Dose di lassativo

Preparazione:

- **Versare** il contenuto della **Dose 2** (due buste: A + B incollate) in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido
- **Aggiungere** acqua **fredda** non gasata fino a raggiungere ½ litro
- **Mescolare** fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta (tenere in frigorifero la soluzione fino al momento dell'assunzione)



Mod-PREPARAZIONE_COLONSCOPIA-pst-rev0-ott25

Poliambulatorio Statuto

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino

Via Saluzzo 50 • 10125 Torino

Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Per informazioni e prenotazioni

• Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090

• Sito web: kormed.it• Email: accettazione.statuto@kormed.it**Modalità di assunzione:**

- Bere un bicchiere di liquido chiaro anche zuccherato
- Assumere **3 compresse di simeticone da 120mg (SIMECRIN 120)**
- Assumere **lentamente e a piccoli sorsi ½ Litro di Plenvu Dose 2 (mezzo bicchiere ogni 10 minuti)** e terminarne l'assunzione nell'arco di **45 minuti. La soluzione è da bere fredda**
- Assumere 3 compresse di simeticone da 120mg (SIMECRIN 120)
- Al termine **bere almeno ½ litro di liquidi chiari** non gasati e non alcolici (acqua, camomilla, brodo, tisane) in **30-45 minuti**
- Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete

Orario esame

Tra le 8.00 e le 9.30
Tra le 9.00 e le 10.00
Tra le 10.00 e le 11.00
Tra le 11.00 e le 12.00
Tra le 12.00 e le 13.00
Tra le 13.00 e le 14.00
Tra le 14.00 e le 15.00
Tra le 15.00 e le 16.00
Tra le 16.00 e le 17.00

**Orario inizio assunzione
1° dose lassativo**

Alle 19.30 del giorno precedente l'esame
Alle 19.30 del giorno precedente l'esame
Alle 19.30 del giorno precedente l'esame
Alle 19.30 del giorno precedente l'esame
Alle 19.30 del giorno precedente l'esame
Alle 19.30 del giorno precedente l'esame
Alle 6.00 del giorno dell'esame
Alle 6.00 del giorno dell'esame
Alle 6.00 del giorno dell'esame

**Orario inizio assunzione
2° dose lassativo**

Alle 4.30 del giorno dell'esame
Alle 5.30 del giorno dell'esame
Alle 6.30 del giorno dell'esame
Alle 7.00 del giorno dell'esame
Alle 8.00 del giorno dell'esame
Alle 9.00 del giorno dell'esame
Alle 10.00 del giorno dell'esame
Alle 11.00 del giorno dell'esame
Alle 12.00 del giorno dell'esame