

Poliambulatorio Statuto

Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino

Via Saluzzo 50 • 10125 Torino

Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)

Via Ivrea 3/A • 10098 Rivoli (TO)

Per informazioni e prenotazioni

• Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090

• Sito web: kormed.it• Email: accettazione.statuto@kormed.it

Istruzione per la preparazione della colonscopia con Plenvu

Gentile Signora/Egregio Signore,

Le è stata programmata una colonscopia. Un'adeguata pulizia dell'intestino è fondamentale per l'esecuzione di un esame diagnostico, affidabile, completo e sicuro; se il suo intestino non è correttamente pulito:

- **vi è il rischio** di non identificare eventuali polipi/lesioni
- **l'esame** può diventare più lungo e complesso
- **vi è il rischio** di dover sospendere l'esame e di dover ripetere la preparazione e la procedura

Consigli nei 7 giorni prima dell'esame:

- **Non assumere** medicinali come **carbone vegetale** o preparati a base di **ferro**
- **Bere almeno 2 litri di acqua al giorno**
- **In caso di stitichezza** (cioè: necessità di mangiare frutta e verdura per regolarizzare le evacuazioni; meno di 3 evacuazioni alla settimana / presenza di feci dure "caprine"), **paziente diabetico o Parkinsoniano: assumere PER 7 GIORNI REDIEPEG SOLUZIONE ORALE, 1 bustina la mattina e 2 bustine la sera**

Dieta da seguire il giorno precedente l'esame

- **NON assumere** frutta, verdura, legumi, pane e pasta integrali
- **PUÒ assumere** pasta e pane di farina bianca, carne magra, pesce, uova, salumi magri, formaggi, patate, gelato, latte, yogurt, brodo e bevande limpide
- **Cena entro le ore 19.00 a base di liquidi chiari e trasparenti anche zuccherati**

Il giorno dell'esame

- **Digiuno:** non è permessa la colazione; è consentita tuttavia **l'assunzione di acqua fino a 2 ore prima dell'esame** per completare la preparazione intestinale o per accompagnare eventuali terapie del mattino

L'assunzione del lassativo è indispensabile per l'esecuzione dell'esame:

- **PLENVU** questa preparazione prevede l'assunzione di **1 litro di soluzione** suddiviso in due dosi + **simeticone compresse masticabili da 120mg** (es. SIMECRIN 120, non compreso nel kit di preparazione) **NON possono assumere** questa preparazione i pazienti con **FAVISMO** o **FENILCHETONURIA**

Nel caso abbia già eseguito una colonscopia e la pulizia del colon NON fosse stata adeguata, scelga un preparato differente da quello assunto la volta precedente

Discuta con il suo medico curante o specialista di riferimento quale preparato scegliere in presenza di grave insufficienza renale o insufficienza cardiaca congestizia

Poliambulatorio Statuto
 Via Alessandro Manzoni 0 • 10122 Torino
 Via Saluzzo 50 • 10125 Torino
 Piazzale Piero Vietti 1 • 10074 Lanzo Torinese (TO)
 Via Ivrea 3/A • 10098 Rivoli (TO)

Per informazioni e prenotazioni
 • Telefono: 011 548944 • 011 5695739 • 0123 416090
 • Sito web: kormed.it
 • Email: accettazione.statuto@kormed.it

PLENVU

Preparazione del lassativo:

Ogni confezione di PLENVU contiene **Dose 1** una busta e **Dose 2** due buste: (A + B incollate).

Devono essere preparate 2 dosi di lassativo come sotto indicato.

1° dose lassativo

Preparazione:

- **Versare** il contenuto della **Dose 1** (una busta) in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido
- **Aggiungere acqua fredda non gasata** fino a raggiungere ½ litro
- **Mescolare** fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta (tenere in frigorifero la soluzione fino al momento dell'assunzione)



Modalità dia assunzione:

- Assumere ½ Litro di Plenvu Dose 1 e terminarne l'assunzione **nell'arco di 40 minuti. La soluzione è da bere fredda.**
- Al termine **bere** almeno ½ litro/1 litro di liquidi chiari non gasati e non alcolici (acqua, camomilla, brodo, tisane) **in 30/45**
- Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete

2° dose lassativo

Preparazione:

- Versare il contenuto delle Dose 2 (due buste: A + B incollate) in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido
- Aggiungere acqua fredda non gasata fino a raggiungere ½ litro
- Mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta (tenere in frigorifero la soluzione fino al momento dell'assunzione)



Modalità dia assunzione:

- Bere un bicchiere di liquido chiaro anche zuccherato
- Assumere **3 compresse di simeticone da 120mg (SIMECRIN 120)**
- Assumere **lentamente e a piccoli sorsi ½ Litro di Plenvu Dose 2 (mezzo bicchiere ogni 10 minuti)** e terminarne l'assunzione **nell'arco di 45 minuti. La soluzione è da bere fredda**
- Assumere **3 compresse di simeticone da 120mg (SIMECRIN 120)**
- Al termine **bere** almeno ½ litro di liquidi chiari non gasati e non alcolici (acqua, camomilla, brodo, tisane) **in 30-45 minuti**
- Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete

ORARIO ESAME	ORARIO INIZIO ASSUNZIONE 1° DOSE LASSATIVO	ORARIO INIZIO ASSUNZIONE 2° DOSE LASSATIVO
Tra le 8.00 e le 9.30	Alle 19.30 del giorno precedente l'esame	Alle 4.30 del giorno dell'esame
Tra le 9.00 e le 10.00	Alle 19.30 del giorno precedente l'esame	Alle 5.30 del giorno dell'esame
Tra le 10.00 e le 11.00	Alle 19.30 del giorno precedente l'esame	Alle 6.30 del giorno dell'esame
Tra le 11.00 e le 12.00	Alle 19.30 del giorno precedente l'esame	Alle 7.00 del giorno dell'esame
Tra le 12.00 e le 13.00	Alle 19.30 del giorno precedente l'esame	Alle 8.00 del giorno dell'esame
Tra le 13.00 e le 14.00	Alle 19.30 del giorno precedente l'esame	Alle 9.00 del giorno dell'esame
Tra le 14.00 e le 15.00	Alle 6.00 del giorno dell'esame	Alle 10.00 del giorno dell'esame
Tra le 15.00 e le 16.00	Alle 6.00 del giorno dell'esame	Alle 11.00 del giorno dell'esame
Tra le 16.00 e le 17.00	Alle 6.00 del giorno dell'esame	Alle 12.00 del giorno dell'esame

Mod-PREPARAZIONE_COLONSCOPIA_PLENVU-stt-rev0-ott25



Scopri la rete di servizi completa su
kormed.it

Parte del Gruppo | **clariane**